

FÖRKLARING

TNM

Klassificering enligt TNM Classification of Malignant Tumours, 6th Edition, 2002, Leslie H Sobin and Ch Wittekind

T¹		Tjocklek	
TX			Djupinvasion kan ej bedömas
Tis			In situ eller LM (eller Clark I)
T1a	≤ 1.0 mm		a) ingen ulceration
T1b		b) ulceration eller Clark IV eller Clark V	
T2a	1.01 – 2.0 mm		a) ingen ulceration
T2b		b) ulceration	
T3a	2.01 – 4.0 mm		a) ingen ulceration
T3b		b) ulceration	
T4a	> 4.0 mm		a) ingen ulceration
T4b		b) ulceration	
N		Antal patologiska lymfkörtlar	
NX		Ej undersökta	Ej bedömda
N0		0	Inga lymfkörtelmetastaser
N1a	1		a) mikrometastaser ²
N1b		b) makrometastaser ³	
N2a	2 – 3		a) mikrometastaser ²
N2b		b) makrometastaser ³	
N2c		c) in transit/satellit(er) utan regionala lymfkörtelmetastaser	
N3		≥ 4 eller konglomerat av lymfkörtlar eller in transit/satellit(er) med regionala lymfkörtelmetastaser	
M	Läge		LD
MX		Ej undersökt	Ej undersökt
M0		Inga metastaser	
M1a	Fjärrmetastas i hud, subkutana eller körtelmetastaser		Normal
M1b	Lungmetastaser		Normal
M1c	Alla andra visceral metastaser		Normal
	Fjärrmetastaser		Förhöjt LD-värde vid två mätningar

¹ Ospecificerade T1, T2, T3 och T4 får anges endast om uppgift om ulceration eller Clarknivå saknas

² Mikrometastaser diagnostiserade efter sentinel node eller elektiv lymfkörtelutrymning.

³ Makrometastaser definieras som kliniskt detekterbara bekräftade med lymfkörtelutrymning eller när metastasen trängt igenom kapseln.