

**TUMÖR I PANKREAS OCH PERIAMPULLÄRA OMRÅDET – PATIENT**

Ifylls i samband med inskrivning alternativt direkt före operation

Originalen skickas till: [adress till regionalt OC]	<b>Vårdenhet/klinik</b>	<b>Patientdata</b>
Datum för ifyllande	2 0	
Anmälade läkare: .....		
<b>PATIENT</b>		
Vikt		(kg)
Längd		(cm)
Datum för åtgärdsbesked till patient	2 0	
Patientens livskvalitet dokumenterad genom QoL-formulär	<input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja
Om Ja, ange vilket/vilka:	QLQ-C30	<input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> ja
	QLQ-PAN26	<input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> ja
<b>Preoperativ co-morbiditet</b>		
Ofrivillig viktnedgång	<input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja
Diabetes	<input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja
Rökning	<input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja
Gallvägar avlastade	<input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja
<b>Hjärtbesvär</b>		
<input type="checkbox"/> Inga		
<input type="checkbox"/> Diuretika, digoxin, antianginal, antihypertensiv behandling		
<input type="checkbox"/> Perifera ödem, warfarin, borderline hjärtförstoring		
<input type="checkbox"/> Förhöjt jugularstryck, hjärtförstoring		
<b>Andning</b>		
<input type="checkbox"/> Ingen dyspné		
<input type="checkbox"/> Ansträngningsdyspné, lätt stas på lungtrg		
<input type="checkbox"/> Begränsad dyspné, måttlig stas		
<input type="checkbox"/> Vilodyspné (frekvens > 30/min), fibros eller "konsolidering"		
<b>Systoliskt blodtryck (mmHg)</b>		
<input type="checkbox"/> ≤ 89	<input type="checkbox"/> 90 – 99	<input type="checkbox"/> 100 – 109
<input type="checkbox"/> 110 – 130	<input type="checkbox"/> 131 – 170	<input type="checkbox"/> ≥ 171
<b>Puls</b>		
<input type="checkbox"/> ≤ 39	<input type="checkbox"/> 40 – 49	<input type="checkbox"/> 50 – 80
<input type="checkbox"/> 81 – 100	<input type="checkbox"/> 101 – 120	<input type="checkbox"/> ≥ 121
<b>EKG</b>		
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Förmaksflimmer (rate 60 – 90)	<input type="checkbox"/> Annan rytmrubbning eller ≥ 5 extraslag/ min; Q- eller ST/T-förändringar
<b>Laboratorievärden</b>		
Hb		(g/L)
LPK		(10 <sup>9</sup> /L)
CRP		(mg/L)
Na		(mmol/L)
K		(mmol/L)
Urea		(mmol/L)
Bilirubin		(umol/L)
<b>Tumörmarkörer preoperativt</b>		
CA 19-9	<input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> ja	Aktuellt värde: <input type="text"/> Övre normalvärde: <input type="text"/>
CEA	<input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> ja	Aktuellt värde: <input type="text"/> Övre normalvärde: <input type="text"/>
<b>Performance status se förklaring på baksidan av blanketten</b>		
ASA	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Performance status enl WHO	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

**ASA**

ASA 1 Frisk patient

ASA 2 Måttligt uttalat sjukdomstillstånd som ej orsakar funktionell begränsning  
Ex. diabetes utan komplikationer, välkontrollerad hypertoni, lindrig organisk hjärtsjukdom

ASA 3 Patient med allvarligt sjukdomstillstånd som orsakar funktionell begränsning  
Ex. diabetes med komplikation, angina pectoris, genomgången hjärtinfarkt (> 6 månader), adipositas (BMI > 30), måttlig uttalad lungsjukdom, intrakraniell tryckstegring

ASA 4 Patient med svår systemsjukdom som är potentiellt livshotande  
Ex. organisk hjärtsjukdom med uttalad hjärtinsufficiens, angina pectoris i vila, hjärtinfarkt < 6 månader

ASA 5 Moribund patient som ej förväntas att överleva 24 timmar  
Ex. patient med rupterat aortaanerysm i chock, komatös patient med stor intrakraniell blödning

**Performance status enligt WHO**

- |   |   |
|---|---|
| 0 | Klarar all normal aktivitet utan begränsning  |
| 1 | Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete                                |
| 2 | Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppe i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar |
| 3 | Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller till stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar              |
| 4 | Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol                                    |